

Protocole IVG Médicamenteuse

1) MIFEPRISTONE 200 mg

1 comprimé pris en consultation devant le praticien.

Anti-progestérone provoquant :

- le décollement de l'œuf
- la contraction du myomètre (couche de muscles tapissant l'intérieur de l'utérus)
- l'ouverture du col

3% des femmes peuvent expulser après ce seul comprimé.

2) MISOPROSTOL 400 µg 24 à 48h plus tard

2 comprimés remis lors de la consultation et à prendre à domicile en présence d'une personne devant être avec vous pendant les 4h suivant la prise (60% d'expulsion dans les 4h à 6h).

Prostaglandine provoquant des contractions utérines et intestinales.



EFFETS INDESIRABLES ET PRECAUTIONS

- En cas de vomissement dans les 30 min suivant la prise, attendez 1h. Si les saignements ont débuté et/ou les douleurs persistent, le principe actif du médicament est passé. S'il ne se passe rien ou que les douleurs diminuent, recontacter le praticien pour une 2^e prise de médicament.
- Les douleurs diminuent après l'expulsion.
- Le Misoprostol entraîne de nombreux signes digestifs (crampes, diarrhées, vomissements...).
- Si vous saignez plus de 4 serviettes nuit ou maxi en 2h, allez aux urgences.
- 27% des femmes expulseront dans les 72h. En cas d'absence de saignement après 72h, présentez-vous aux urgences.
- En cas de douleurs ou fièvre persistant plus de 24h, allez aux urgences.
- Les saignements post expulsion durent en moyenne 15 jours.
- Le taux de BhcG va décroître mais peut rester positif pendant 90 jours (pas de test urinaire !).
- L'efficacité absolue de la méthode n'est pas garantie. Le taux de grossesse évolutive est de 1%, le taux d'échec de 2 à 3%. D'où l'importance de la visite de contrôle, trop souvent négligée.
- Le Misoprostol est tératogène et peut être responsable de malformations fœtales.

En cas de doutes, contactez-moi au 06.38.71.40.20

En cas d'urgence, contactez les urgences de la maternité de Saint Maurice au 01.43.96.65.98 et demandez à parler à l'interne de garde (bip 8111).